

Індикатори	2024	2025	2026
KP-1d Відсоток людей, які вживають ін'єкційні наркотики, охоплених програмами профілактики ВІЛ – визначений пакет послуг	5200	5900	6600
HTS-3d Відсоток людей, які вживають ін'єкційні наркотики та протягом звітного періоду пройшли тест на ВІЛ і знають про його результати	15502	16478	17482
KP-1c Відсоток секс-працівників, охоплених програмами профілактики ВІЛ - визначений пакет послуг	1200	1500	1800
HTS-3c Відсоток секс-працівників, які протягом звітного періоду пройшли тест на ВІЛ і знають про його результати	5393	5662	5946
KP-1a Відсоток чоловіків, які мають секс із чоловіками, охоплених програмами профілактики ВІЛ - визначений пакет послуг	7300	8700	10000
HTS-3a Відсоток чоловіків, які мають секс із чоловіками, які пройшли тест на ВІЛ протягом звітного періоду і знають про його результати	9312	9962	10724
KP-1b Відсоток транс*людей, охоплених програмами профілактики ВІЛ - визначений пакет послуг	5250	5800	6450
HTS-3b Відсоток транс*людей, які пройшли тест на ВІЛ протягом звітного періоду і знають про його результати	4119	4501	4966
KP-6a Число чоловіків, які мають секс із чоловіками, які хоча б раз протягом звітного періоду отримали препарат ДКП	2599	2989	3436
KP-6d Число людей, які вживають ін'єкційні наркотики, які хоча б раз протягом звітного періоду отримали препарат ДКП	561	648	746
KP-6b Число транс*людей, які хоча б раз протягом звітного періоду отримали препарат ДКП	20	25	30
KP-6c Число секс-працівників, які хоча б раз протягом звітного періоду отримали препарат ДКП	253	292	321
TBDT-1 Число зареєстрованих пацієнтів з усіма формами ТБ з числа представників уразливих груп (бактеріологічно підтверджені та клінічно діагностовані випадки)	600	156	
DRTB-Other 1 Число пацієнтів з РР-ТБ або МЛС-ТБ, охоплених комплексною психосоціальною підтримкою	2374	1744	1744
DRTB-9 Рівень успішності лікування РР-ТБ або МЛС-ТБ: відсоток пацієнтів з РР-ТБ або МЛС-ТБ, які були успішно вилікувані	67%	69%	71%
DRTB-4 Відсоток пацієнтів з РР-ТБ/МЛС-ТБ, які не розпочали лікування та/або почали лікування МЛС-ТБ та були втрачені з-під нагляду протягом перших шести місяців лікування	6%	5.5%	5%
KP-5 Відсоток осіб на опіоїдній замісній терапії, які отримували лікування щонайменше протягом 6 місяців	90%	91%	92%
TCS - Other 2: Відсоток людей, які вживають ін'єкційні наркотики, які отримали позитивний результат тесту на ВІЛ та були взяті під медичний нагляд у закладах охорони здоров'я	95%	95%	95%