

Идея: Мирослава Андрущенко, Оксана Матияш
Дизайн: Ольга Миколайчук. Обложка: Ирина Федченко.
© Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2013
Распространяется бесплатно. Тираж 10 000 экз.

Публикация подготовлена и опубликована в рамках программы «Построение устойчивой системы предоставления комплексных услуг по профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке для групп риска и ЛЖВ в Украине», при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией.

Круглосуточный бесплатный телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД:

0 800 500 451

Незащищенный оральный секс





Незащищенный оральный секс

Существует миф, что оральный секс – это безопасный вид секса, во время которого ВИЧ и ИППП не передаются. Действительно, вероятность инфицирования во время орального секса довольно низкая, но она существует.

Если человек инфицирован инфекциями, перечисленными ниже, то существует риск их передачи также во время орального секса:

- **Герпес** является наиболее распространённой инфекцией, передающейся половым путём. Первый тип герпеса, в основном, вызывает появление язв вокруг губ, а второй, как правило, вызывает появление язв вокруг половых органов. Если у человека вирус типа 1 и он занимается оральным сексом с другим человеком, герпес может поражать половые органы другого человека, вызывая появление на них язв. Этот процесс может работать и в обратном направлении.
- **Гонорея** легко передается во время занятий оральным сексом. Гонококк, бактерия вызывающая заболевание, живёт и развивается в клетках слизистых оболочек и в слизистой горла чувствует себя комфортно. Инфекция передаётся через заражённые половые органы, поражая горло, а через него может перейти к гениталиям другого человека.

- **Сифилис** легко передается, если рот человека контактирует с открытой язвой или раздражением на коже, которое вызвано инфекцией.

- **Вирус гепатита В** находится в жидкостях тела человека (сперма, вагинальные выделения, кровь) и может передаваться во время орального секса.

- **Вирус гепатита С** находится в крови и его передача возможна только при условии, что во время полового контакта присутствует кровь.

- **Хламидии и вирус папилломы**, вызывающий появление бородавок на половых органах человека, может передаваться также во время орального секса при наличии микроповреждений на слизистой ротовой полости.

Использование презерватива во время любого вида сексуального контакта – твоё здоровье, долголетие и хорошее настроение!